



RYBELSUS[®]
semaglutide tablets 7mg | 14mg

Su guía para tomar RYBELSUS[®]

**Pague tan solo \$10 por una
receta de hasta 3 meses.^a
Envíe el mensaje de texto^b
LISTO al 21848.**

^aSolo para pacientes elegibles y con seguro de salud comercial. Para una dosis de 3 mg, pague tan solo \$10 por mes. Se aplican restricciones.

^bSe pueden aplicar tarifas por datos y mensajes. Consulte con su proveedor de servicios móviles. Vea los Términos y condiciones de uso en espanol.RYBELSUS.com.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo de la página web y haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción y la Guía del medicamento.

Cómo empezar a tomar RYBELSUS®

EMPIECE CON 3 mg




La dosis inicial es de 3 mg durante los primeros 30 días. Esto le dará a su cuerpo la oportunidad de adaptarse al medicamento.




SIGA CON 7 mg



Quando termine todas las pastillas de 3 mg, empiece con la receta de 7 mg.

 Tome RYBELSUS® exactamente como se lo indique su médico para asegurarse de que funcione como es debido, reduciendo su nivel de azúcar en la sangre.

 Recuerde pasar por la farmacia a surtir su receta de 7 mg.

¿Por qué debe cambiar mi dosis de RYBELSUS®?

La dosis inicial es de 3 mg por los primeros 30 días para ayudar a su cuerpo a adaptarse al medicamento. Su médico le recetó una dosis de 7 mg para ayudarle a bajar el nivel de azúcar en la sangre. Si necesita más control del nivel de azúcar en la sangre, su médico podría recetarle la dosis de 14 mg.

 *Siga leyendo para conocer más acerca de comenzar a tomar RYBELSUS®.*

¿Qué es RYBELSUS®?

RYBELSUS® (semaglutide) tablets 7 mg or 14 mg es un medicamento de venta con receta que se usa junto con dieta y ejercicio para mejorar el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre en adultos con diabetes tipo 2.

- RYBELSUS® no es para usar en personas con diabetes tipo 1.
- Se desconoce si RYBELSUS® es seguro y eficaz para su uso en niños.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo de la página web y haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción y la Guía del medicamento.

RYBELSUS®
semaglutide tablets 7mg | 14mg

Tome RYBELSUS® de la misma forma, todos los días

Para que RYBELSUS® funcione debidamente para bajar el nivel de azúcar en la sangre:



Tómelo con el estómago vacío por la mañana. No tome más de 1 pastilla al día.



Tómelo con un sorbo de agua natural, no más de 4 onzas, y sin otros líquidos.



Espere 30 minutos antes de comer, beber o tomar otros medicamentos orales, vitaminas o suplementos.

Encuentre respuestas a preguntas frecuentes en preguntasdeRYBELSUS.com.

💡 Si olvida tomar una dosis, debe saltarse la dosis que haya omitido, y tomar la dosis siguiente al otro día.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo de la página web y haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción y la Guía del medicamento.

RYBELSUS®
semaglutide tablets 7mg | 14mg

Cómo guardar RYBELSUS®

Para que RYBELSUS® funcione debidamente para bajar el nivel de azúcar en la sangre:



Guarde las pastillas de RYBELSUS® en su frasco original cerrado hasta que vaya a tomar una.




No use un recipiente organizador de pastillas ni un frasco diferente para guardar las pastillas de RYBELSUS®.



Trague la pastilla entera. No la corte, triture ni mastique.

 Almacene el medicamento a una temperatura ambiente de 68 °F a 77 °F.

 RYBELSUS® viene en un frasco a prueba de niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Mantenga el frasco tapado para mejor resultado



La tapa azul del frasco de RYBELSUS® está especialmente diseñada para mantener sus pastillas protegidas y para asegurar que puedan funcionar según lo planeado para reducir su nivel de azúcar en la sangre. Es importante que las pastillas de RYBELSUS® permanezcan en el frasco con la tapa cerrada hasta que vaya a tomarse una.

Información importante de seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre RYBELSUS®?

RYBELSUS® podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer.** Informa a tu médico si tienes un bulto o hinchazón en el cuello, ronquera, dificultad para tragar o te falta el aire. Estos podrían ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios con roedores, RYBELSUS® y otros medicamentos que actúan como RYBELSUS® causaron tumores en la tiroides, incluso cáncer de tiroides. Se desconoce si RYBELSUS® causará tumores de tiroides o un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) en las personas.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo de la página web y haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción y la Guía del medicamento.

RYBELSUS®
semaglutide tablets 7mg | 14mg

Efectos secundarios comunes

Los efectos secundarios más comunes de RYBELSUS® pueden incluir náuseas, dolor de estómago (abdominal), diarrea, disminución del apetito, vómitos y estreñimiento. Las náuseas, los vómitos y la diarrea son más comunes al comenzar con RYBELSUS®:

Si tiene náuseas mientras toma RYBELSUS®, consulte a su médico.

Estos son algunos consejos para las náuseas que podrían ser útiles:

- ✓ Coma despacio, porciones más pequeñas y con más frecuencia
- ✓ Consuma alimentos ligeros y fáciles de digerir, como galletas de sal o pan sencillo
- ✓ Evite alimentos fritos, grasosos o dulces
- ✓ Tome bebidas transparentes o heladas

^aEn estudios realizados, los efectos secundarios gastrointestinales (GI) fueron más comunes en las personas que tomaron RYBELSUS® que en las que tomaron un placebo, y las personas que tomaron RYBELSUS® fueron más propensas a interrumpir el tratamiento debido a estos efectos secundarios. Las náuseas, los vómitos y la diarrea podrían causar pérdida de fluidos (deshidratación), lo cual podría empeorar problemas renales existentes (incluida la insuficiencia renal).

Información importante de seguridad

No uses RYBELSUS® si:

- Tú o alguien de tu familia ha tenido CMT, o si tienes una enfermedad del sistema endocrino llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).
- Has tenido una reacción alérgica grave a la semaglutida o a alguno de los ingredientes de RYBELSUS®. Ve los síntomas de una reacción alérgica grave en “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de RYBELSUS®?”.

Antes de usar RYBELSUS®, informa a tu médico si tienes cualquier otra afección médica, incluso si:

- Tienes o has tenido problemas del páncreas o los riñones.
- Tienes antecedentes de problemas de la vista relacionados con la diabetes.
- Tienes programada una cirugía u otros procedimientos que utilizan anestesia local o anestesia general (sedación profunda).
- Estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si RYBELSUS® puede dañar a tu bebé en gestación. Debes suspender el uso de RYBELSUS® 2 meses antes del momento en que planeas quedar embarazada.
- Estás amamantando o planeas amamantar. No se recomienda amamantar durante el tratamiento con RYBELSUS®.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo de la página web y haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción y la Guía del medicamento.

RYBELSUS®
semaglutide tablets 7mg | 14mg

Ahorros con RYBELSUS®



AHORRE EN RYBELSUS®



DE HASTA



3 MESES

*Para recibir la oferta, la receta para las dosis de 7 mg o 14 mg debe ser para un suministro de 1, 2 o 3 meses. Para una dosis de 3 mg, pague tan solo \$10 por mes. Aplica solo a pacientes elegibles y con seguro de salud comercial. Sujeto a un ahorro máximo de \$300 por suministro de 1 mes, \$600 por suministro de 2 meses o \$900 por suministro de 3 meses. Se aplican requisitos de elegibilidad y otras restricciones.

¿Quién puede obtener la Oferta de Ahorros de RYBELSUS®?

Para ser elegible, es necesario tener cobertura de un seguro de salud comercial. Se aplican requisitos de elegibilidad y otras restricciones. Visite ahorrosparaRYBELSUS.com para ver toda la información del programa y los requisitos de elegibilidad.

Inscríbese para obtener apoyo con RYBELSUS®



APOYO CON RYBELSUS®

¡Inscríbese y reciba mensajes de texto con recordatorios para tomar la pastilla, información útil y frases motivacionales!

Envíe el mensaje de texto^b
LISTO al 21848 para comenzar.

^bSe pueden aplicar tarifas por datos y mensajes. Consulte con su proveedor de servicios móviles. Vea los Términos y condiciones de uso en espanol.RYBELSUS.com.



APOYO PERSONALIZADO EN VIVO

Puede obtener más apoyo adicional de un Instructor de Salud en Diabetes, si lo necesita.

Llame al **1-833-275-2233**
de lunes a viernes,
9:00 a.m. a 6:00 p.m., hora del este.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo de la página web y haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción y la Guía del medicamento.


RYBELSUS®
semaglutide tablets 7mg | 14mg

Lleve un registro de su dosis

Imprima las imágenes del frasco a continuación para llevar un registro de los primeros 30 días con la dosis de 3 mg de RYBELSUS®. Marque uno de los espacios que aparecen abajo después de tomar su pastilla diaria. Esto podría ayudarle a integrar RYBELSUS® a su rutina al despertarse.

EMPIECE CON 3 mg

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30

 Mantenga sus pastillas de RYBELSUS® en su frasco cerrado con la tapa azul para asegurar que puedan funcionar según lo planeado para reducir su nivel de azúcar en la sangre.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo de la página web y haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción y la Guía del medicamento.

RYBELSUS®
semaglutide tablets 7mg | 14mg

Información importante de seguridad (cont.)

Informa a tu médico acerca de todos los medicamentos que usas, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. RYBELSUS® puede afectar la forma en que actúan algunos medicamentos y algunos medicamentos pueden afectar la forma en que actúa RYBELSUS®.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de RYBELSUS®?

RYBELSUS® podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Inflamación del páncreas (pancreatitis).** Suspende el uso de RYBELSUS® y llama de inmediato a tu médico si tienes dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que no desaparece, con o sin vómitos. Podrías sentir el dolor desde el abdomen hasta la espalda.
- **Cambios en la vista.** Informa a tu médico si presentas cambios en la vista durante el tratamiento con RYBELSUS®.
- **Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia).** El riesgo de hipoglucemia podría ser mayor si usas RYBELSUS® junto con otro medicamento que pueda causar hipoglucemia, como una sulfonilurea o insulina.
Los signos y síntomas de un nivel bajo de azúcar en la sangre podrían incluir: mareos o aturdimiento, vista borrosa, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor, sudoración, habla arrastrada, hambre, confusión o somnolencia, temblores, debilidad, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados y sensación de nerviosismo.
- **Problemas renales (insuficiencia renal).** En las personas que tienen problemas renales, tener diarrea, náuseas y vómitos podría hacer que pierdan líquidos (deshidratación), lo que podría empeorar los problemas en los riñones. Es importante tomar líquidos para reducir la probabilidad de deshidratación.
- **Problemas de estómago graves.** Se han reportado problemas estomacales, a veces graves, en personas que usan RYBELSUS®. Informa a tu médico si tienes problemas estomacales que sean graves o que no desaparezcan.
- **Reacciones alérgicas graves.** Suspende el uso de RYBELSUS® y busca asistencia médica de inmediato si tienes síntomas de una reacción alérgica grave, como hinchazón de tu cara, labios, lengua o garganta; problemas para respirar o tragar; sarpullido o picazón severos; desmayo o sensación de mareo; o latidos cardíacos acelerados.
- **Problemas de la vesícula biliar.** Algunas personas que toman RYBELSUS® han tenido problemas de vesícula biliar. Informa a tu médico de inmediato si presentas síntomas de problemas de la vesícula biliar, que podrían incluir: dolor en la parte superior del estómago (abdomen), coloración amarillenta de la piel o los ojos (ictericia), fiebre y heces de color arcilla.
- **La entrada de alimentos o líquidos a los pulmones durante una cirugía u otros procedimientos que utilizan anestesia local o anestesia general (sedación profunda).** RYBELSUS® podría aumentar la posibilidad de que los alimentos entren a tus pulmones durante una cirugía u otros procedimientos. Informa a todos tus médicos que estás tomando RYBELSUS® antes de programar someterte a una cirugía u otros procedimientos.

Los efectos secundarios más frecuentes de RYBELSUS® podrían incluir náuseas, dolor de estómago (abdominal), diarrea, disminución del apetito, vómitos y estreñimiento. Las náuseas, los vómitos y la diarrea son más frecuentes al comenzar a tomar RYBELSUS®.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo de la página web y haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción y la Guía del medicamento.

RYBELSUS®
semaglutide tablets 7mg | 14mg

Ahorros y apoyo a su alcance con solo un mensaje de texto.

Envíe el mensaje de texto^a **LISTO** a **21848** para comenzar.

^aSe pueden aplicar tarifas por datos y mensajes. Consulte con su proveedor de servicios móviles. La frecuencia de los mensajes se basará en las opciones que haya seleccionado. Envíe el mensaje de texto AYUDA al 21848 si necesita ayuda. Escriba CANCELAR al 21848 para cancelar. Consulte los Términos y condiciones de uso en espanol.RYBELSUS.com.

CONSEJOS ÚTILES

- ✓ Lleve un registro de sus niveles de azúcar en la sangre y compártalo con su médico en su próxima cita
- ✓ Haga que comer saludable y hacer ejercicio sean parte de su rutina diaria
- ✓ Recuerde programar todas sus citas médicas, como exámenes de la vista y de los pies
- ✓ Crear un hábito nuevo es más fácil si lo puede integrar a su rutina diaria, como cepillarse los dientes

Llame al 1-833-275-2233 o visite espanol.RYBELSUS.com para más información.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo de la página web, y haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción y la Guía del medicamento.

RYBELSUS® es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.

Novo Nordisk es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.

© 2025 Novo Nordisk Todos los derechos reservados. US24RYB00664 enero de 2025

