



Para adultos con diabetes tipo 2

Guía para conversar con su médico sobre RYBELSUS[®]

Su médico puede ser un gran aliado en el manejo de su diabetes tipo 2. No tema hacer preguntas. Las sugerencias a continuación pueden ayudarle en su próxima visita:

Mis números

- Por favor, dígame otra vez qué es el A1C.
- ¿Cuál es mi objetivo de A1C? ¿Lo he logrado?
- He usado mi medicamento, estoy comiendo saludable y manteniéndome activo. ¿Por qué no está bien mi A1C?
- ¿Cómo es posible que mi diabetes esté avanzada si me diagnosticaron hace poco?

Preguntas sobre RYBELSUS[®]

- ¿Qué es RYBELSUS[®] y cómo funciona para bajar el nivel de azúcar en la sangre?
- ¿Es RYBELSUS[®] apropiado para mí?
- ¿En qué se diferencia RYBELSUS[®] del/de los medicamento(s) que estoy usando ahora?
- ¿Reemplazaría RYBELSUS[®] el/los medicamento(s) que estoy usando ahora?
- ¿Afectará mi peso RYBELSUS[®]?
- ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de RYBELSUS[®]?
- ¿Lo cubre mi seguro? ¿Cómo puedo obtener ahorros en mi copago?

¿Qué es RYBELSUS[®]?

RYBELSUS[®] (semaglutide) tablets 7 mg or 14 mg es un medicamento de venta con receta que se usa junto con dieta y ejercicio para mejorar el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre en adultos con diabetes tipo 2.

- RYBELSUS[®] no es para usar en personas con diabetes tipo 1.
- Se desconoce si RYBELSUS[®] es seguro y eficaz para su uso en niños.

Información importante de seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre RYBELSUS[®]?

RYBELSUS[®] podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer.** Informa a tu médico si tienes un bulto o hinchazón en el cuello, ronquera, dificultad para tragar o te falta el aire. Estos podrían ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios con roedores, RYBELSUS[®] y otros medicamentos que actúan como RYBELSUS[®] causaron tumores en la tiroides, incluso cáncer de tiroides. Se desconoce si RYBELSUS[®] causará tumores de tiroides o un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) en las personas.

Vaya preparado a su visita

Además de esta guía, puede ayudarle llevar:

- Una lista de sus medicamentos, incluyendo vitaminas y suplementos
- Una lista de los remedios caseros que usa, si está usando alguno
- Un diario donde anota sus hábitos diarios tales como su dieta, actividad física y cómo se ha sentido

Ahorros y apoyo

Busque su costo de bolsillo y obtenga una oferta de ahorros en [RYBELSUSavings.com](https://www.rybelsus.com/savings)

Disponible solo en inglés

Información importante de seguridad (continúa)

No uses RYBELSUS® si:

- Tú o alguien de tu familia ha tenido CMT, o si tienes una enfermedad del sistema endocrino llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).
- Has tenido una reacción alérgica grave a la semaglutida o a alguno de los ingredientes de RYBELSUS®. Ve los síntomas de una reacción alérgica grave en “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de RYBELSUS®?”.

Antes de usar RYBELSUS®, informa a tu médico si tienes cualquier otra afección médica, incluso si:

- Tienes o has tenido problemas del páncreas o los riñones.
- Tienes antecedentes de problemas de la vista relacionados con la diabetes.
- Tienes programada una cirugía u otros procedimientos que utilizan anestesia local o anestesia general (sedación profunda).
- Estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si RYBELSUS® puede dañar a tu bebé en gestación. Debes suspender el uso de RYBELSUS® 2 meses antes del momento en que planeas quedar embarazada.
- Estás amamantando o planeas amamantar. No se recomienda amamantar durante el tratamiento con RYBELSUS®.

Informa a tu médico acerca de todos los medicamentos que usas, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. RYBELSUS® puede afectar la forma en que actúan algunos medicamentos y algunos medicamentos pueden afectar la forma en que actúa RYBELSUS®.

¿Cómo debo tomar RYBELSUS®?

- Toma RYBELSUS® exactamente como te lo indique tu médico.
- No tomes más de 1 pastilla al día.
- Toma RYBELSUS® por vía oral y en ayunas, por la mañana, con un sorbo de agua corriente (no más de 4 onzas). No tomes RYBELSUS® con ningún otro líquido que no sea agua.
- No partas, tritures ni mastiques las pastillas de RYBELSUS®. Traga la pastilla entera.
- Después de 30 minutos, puedes comer, beber o tomar otros medicamentos orales.
- Si omites una dosis de RYBELSUS®, sáltate la dosis omitida y continúa con tu horario habitual.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de RYBELSUS®?

RYBELSUS® podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Inflamación del páncreas (pancreatitis).** Suspende el uso de RYBELSUS® y llama de inmediato a tu médico si tienes dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que no desaparece, con o sin vómitos. Podrías sentir el dolor desde el abdomen hasta la espalda.
- **Cambios en la vista.** Informa a tu médico si presentas cambios en la vista durante el tratamiento con RYBELSUS®.
- **Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia).** El riesgo de hipoglucemia podría ser mayor si usas RYBELSUS® junto con otro medicamento que pueda causar hipoglucemia, como una sulfonilurea o insulina. **Los signos y síntomas de un nivel bajo de azúcar en la sangre podrían incluir:** mareos o aturdimiento, vista borrosa, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor, sudoración, habla arrastrada, hambre, confusión o somnolencia, temblores, debilidad, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados y sensación de nerviosismo.
- **Problemas renales (insuficiencia renal).** En las personas que tienen problemas renales, tener diarrea, náuseas y vómitos podría hacer que pierdan líquidos (deshidratación), lo que podría empeorar los problemas en los riñones. Es importante tomar líquidos para reducir la probabilidad de deshidratación.
- **Problemas de estómago graves.** Se han reportado problemas estomacales, a veces graves, en personas que usan RYBELSUS®. Informa a tu médico si tienes problemas estomacales que sean graves o que no desaparezcan.
- **Reacciones alérgicas graves.** Suspende el uso de RYBELSUS® y busca asistencia médica de inmediato si tienes síntomas de una reacción alérgica grave, como hinchazón de tu cara, labios, lengua o garganta; problemas para respirar o tragar; sarpullido o picazón severos; desmayo o sensación de mareo; o latidos cardíacos acelerados.
- **Problemas de la vesícula biliar.** Algunas personas que toman RYBELSUS® han tenido problemas de vesícula biliar. Informa a tu médico de inmediato si presentas síntomas de problemas de la vesícula biliar, que podrían incluir: dolor en la parte superior del estómago (abdomen), coloración amarillenta de la piel o los ojos (ictericia), fiebre y heces de color arcilla.
- **La entrada de alimentos o líquidos a los pulmones durante una cirugía u otros procedimientos que utilizan anestesia local o anestesia general (sedación profunda).** RYBELSUS® podría aumentar la posibilidad de que los alimentos entren a tus pulmones durante una cirugía u otros procedimientos. Informa a todos tus médicos que estás tomando RYBELSUS® antes de programar someterte a una cirugía u otros procedimientos.

Los efectos secundarios más frecuentes de RYBELSUS® podrían incluir náuseas, dolor de estómago (abdominal), diarrea, disminución del apetito, vómitos y estreñimiento. Las náuseas, los vómitos y la diarrea son más frecuentes al comenzar a tomar RYBELSUS®.

Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de RYBELSUS®.

RYBELSUS® es un medicamento de venta bajo receta.

Se recomienda que informe a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.



RYBELSUS® es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.
Novo Nordisk es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.
© 2025 Novo Nordisk Todos los derechos reservados U524RYB01146 febrero de 2025

RYBELSUS®
semaglutide tablets 7mg | 14mg